


Когнитивные нарушения сосудистого генеза: диагностика и терапия

Когнитивные нарушения – субъективное и/или объективно выявляемое ухудшение когнитивных функций* (КФ) по сравнению с исходными индивидуальными, средневозрастными уровнями вследствие органической патологии головного мозга, приводящие к нарушениям обучения, профессиональной, социальной и бытовой деятельности.



Этапы диагностики



*Наиболее сложные функции головного мозга: память, внимание, психомоторная координация, речь, гнозис, праксис, счет, мышление, ориентация, планирование, контроль высшей психической деятельности.

Принципы лечения

✓ Немедикаментозная терапия

Адекватная умственная и физическая нагрузки, активная социальная деятельность, нейропсихологическая реабилитация.

✓ Медикаментозная терапия

Этиологическое и патогенетическое лечение: гипотензивные средства, статины, антиагреганты, непрямые антикоагулянты, ноотропные препараты.

Билобил® – препарат растительного происхождения, оказывающий комплексное нейропротективное и антиоксидантное действия:

- множество оказываемых эффектов дает возможность избежать полипрагмазии;
- сложно передозировать, хорошо переносится, минимум побочных явлений.

Фармакотерапевтические эффекты препарата Билобил®

✓ Нейропротекторный

- Улучшение энергетического метаболизма нейронов, защита от гипоксии и ишемического повреждения
- Защита от перекисного окисления липидов и сохранение функции мембран
- Ингибирование нейронального апоптоза
- Защитное и терапевтическое действие при отеке мозга
- Связывание свободных радикалов в митохондриях

✓ Антиагрегантный

- Улучшение реологических свойств крови, снижение вязкости крови
- Улучшение микроциркуляции

✓ Холинергический

- Снижение возрастного дефицита

✓ Ноотропный

- Улучшение КФ
- Уменьшение эмоциональных нарушений

✓ Антистрессорный

- Угнетение индуцированной стрессом гиперсекреции кортикостероидов
- Угнетение экспрессии гена кортикотропин-рилизинг-гормона и его секреции

Заболевание	Дозировка препарата Билобил®	Эффекты	Исследование
ДЭ 1-й степени	120 мг/сут 3 мес	Увеличились объем запоминания и воспроизведения, концентрация и устойчивость внимания, уменьшились частота и выраженность головной боли, головокружения и шума в голове, улучшился сон, увеличилась работоспособность	Яхно Н.Н. и соавт., 1998
ДЭ 1–2-й степени	160 мг/сут 3 мес	Выраженное положительное влияние на мнестические функции, значительно улучшились беглость речи и концентрация внимания	Грибачева И.А. и соавт., 2007
ДЭ 2–3-й степени	240 мг/сут 3 мес	Регресс симптомов, положительное влияние на когнитивные функции и астеническую симптоматику. Улучшение качества жизни	Мищенко Т.С. и соавт., 2012